

Síntomas y causas de un nivel alto o bajo de la glucosa

Síntomas de un nivel alto de la glucosa en la sangre (Hiperglucemia)	Causas del nivel alto de la glucosa en la sangre	Síntomas de un nivel bajo de la glucosa en la sangre (Hipoglucemia)	Causas de un nivel bajo de la glucosa en la sangre
Sed	Comer mucho	Escalofríos	Comer poco
Hambre	Poca actividad física	Sudoración	Mucha medicina
Orinar frecuentemente	Poca medicina	Hambre	Más actividad de la
Fatiga	Estrés	Ansiedad	usual
Nauseas	Enfermedad	Temblores	Esperar mucho tiempo entre comidas y bocadillos Bebidas alcohólicas.
Visión borrosa	Lesiones	Confusión	
Dolor de cabeza		Actuar enojado o	
Nerviosismo		irritable	
Confusión		Tartamudeo	
		Dolor de cabeza	









Ejemplos para el tratamiento de la Hipoglucemia

Comidas	Cantidad	
Jugo de naranja o manzana	1/2 taza	
Jugo de uva o arándano	1/3 de taza	
Bebidas dulces – (refresco regular Pepsi®, Coca Cola®)	1/2 taza	
Miel o jarabe (almíbar) de maíz	1 cucharada	
Bolsitas de azúcar	3	
Dulces Lifesavers®	8–10	
Pasas	2 cucharadas	
Tabletas de glucosa	3–4	
Leche desnatada o baja en grasa	1 taza (8 onzas)	

Dentro de los siguientes 15 minutos del tratamiento, debe sentirse mejor. Examine su glucosa. Si sigue menos de 70 mg/dl, o si no se siente mejor, tome otros 15 gramos de carbohidratos de acción rápida

Prepare un plan escolar para su hijo(a) con diabetes



Al comienzo de cada año escolar, comuníquese con los administradores de la escuela, maestros y entrenadores de su hijo, así como la enfermera para hacer un plan de como manejar la diabetes de su hijo(a) mientras esté en la escuela.

El plan debe incluir:

- 1. El horario de cuando debe examinarse la glucosa de la sangre y tomar la insulina
- 2. Bocadillos (meriendas) y comidas a tiempo
- 3. Prefiera bocadillos livianos
- 4. Reconocer los síntomas típicos y el tratamiento a seguir en caso de tener la glucosa de la sangre baja
- 5. Tener a mano la información de los padres o alguna persona responsable en caso de emergencia
- 6. Designar a una persona para que ayude al niño(a) con diabetes en caso de necesidad

