

# "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

## \*PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO\*

Durante el manejo del producto **Racumín® Líquido** se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos y lentes de seguridad básica.

## \*PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO\*

• "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO". • "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". • "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". • "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". • "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". • "NO SE INGERA, INHALE Y ÉTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL". • "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

## \*EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA\*

**\*PRIMEROS AUXILIOS\*** Manténgase al paciente abrigado y en reposo, llévese al médico. En caso de contacto con los ojos enjuáguese abundantemente con agua limpia. En caso de contacto con la piel lívese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión provócase el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente, introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a criterio médico se sugiere el lavado gástrico. Consulte al médico inmediatamente.

## \*RECOMENDACIONES AL MÉDICO\*

**\*coumatetralil\*** es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las hidroxicumarinas. **Signos y síntomas de intoxicación:** inapetencia, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel. **Tratamiento y antídoto:** adminístrese vitamina K1 (flomenadiona) como antídoto específico por vía oral intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bihidroxicumarinas. Repítase el tratamiento en caso de ser necesario, basándose en la observación del tiempo de protrombina. La dosis máxima de vitamina K1 deberá ser de 40 mg/día.

**Recomendaciones al Médico Veterinario:** los signos en los animales intoxicados son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K1 como antídoto a la dosis de 5 a 10 mg/ kg SC u oral durante 3 semanas. En casos graves se recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de compatibilidad sanguínea.

**URGENCIAS** En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año), Teléfonos 01 (55) 5596-6659 y 01 (55) 5611-2634; **LADA SIN COSTO 01800 0092900.**

## \*MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE\*

• "Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos". • "Manejo el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas". • "El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de las mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)". • "En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano". • "Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación". • Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

## GARANTÍA

**Bayer de México, S.A. de C.V.** garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

# "USO VETERINARIO"

"CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

## Racumín® Líquido



RSC0-PEC-RDDE-513-01-06-0.8

*coumatetralil*

**Rodenticida de uso pecuario,  
líquido, coumarínico**

**Composición porcentual\***

<b>Ingrediente activo:</b> Coumatetralil: 44.95g/500 mL (1.2344g/ml) + 1-metil-3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-5-pyridin-2-ylidene-1H-imidazole-4-carboxamide (Equivalente a 8.0 g. de IAU)	0.80
<b>Ingredientes inertes:</b> Coadyuvantes y solventes.	99.20
	<b>Total 100.00</b>

**% en peso**

**Contenido neto: 100 mL**

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Puede ser nocivo si se inhala

**ÁREA SIN BARNIZ**

**"HECHO EN MÉDICO"**

Título del registro, formulador y distribuidor Bayer de México, S.A. de C.V. Oficina: Reg. de Comercio Exterior, No. 238, Cd. Arboledón Grande, C.P. 11350, México, D.F. Tel: 81 251 5128 3000. Planta y almacén: Vía Interoceánica No. 2004, Sta. Clara Coahuila, Coahuila de Zaragoza, Est. de México, C.P. 65640

Science For A Better Life

RFC: 0680226119SL8

© Marca Registrada por Bayer

## "PRECAUCIONES DE USO"

### "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Utilizar **Racumín® Líquido** exclusivamente en instalaciones relacionadas con la actividad pecuaria, establos, caballerizas, zahurdas, granjas avícolas, granjas acuícolas, criaderos, zoológicos.

Determinar los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rinones y lugares poco accesibles, en el perímetro de las instalaciones ó en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspeccionar las áreas tratadas al tercer día y reponer el cebo consumido. Mantener una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de los roedores.

### Dosis, preparación de la mezcla y método de aplicación

Utilizar para el control de la rata común o de albanillas (*Rattus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*) y ratón doméstico (*Rattus musculus*) de la siguiente forma: diluir 500 mL de **Racumín® Líquido** en 15 litros de agua limpia (1 parte de **Racumín® Líquido** con 30 partes iguales de agua).

Colocar de 250 a 500 mL de la dilución de **Racumín® Líquido** dentro de cebaderos profesionales, cerca de los lugares más frecuentados por los roedores o puede colocarse dentro de cebaderos de plástico, pero no de metal. Distribuir los cebaderos o cebaderos pegados a la pared cada 5 a 10 m de distancia y cerca de madrigueras para el control de ratas y cada 3 o 4 m para el control de ratones.

También puede ser utilizado como cebo concentrado para el control de ratas: 10 a 20 mL (2 a 4 cucharadas) de **Racumín® Líquido** en diluir sobre pan galletas, siempre y cuando se coloquen dentro de cebaderos inoxidables.

**Frecuencia de aplicación:** Repetir el tratamiento a intervalos semanales, hasta que disminuya el consumo de cebo o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfecciones establezcanse tratamientos de mantenimiento y eliminen en lo posible las situaciones que propicien el desarrollo de roedores como basura y alimentos a su alcance. Si ocurre una reinfección repítase el tratamiento. Recolectarse y dispóngase adecuadamente de los roedores muertos y del cebo no consumido. El uso de cebaderos herméticos profesionales incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan reinfecciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario.

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** debido a que este producto es un rodenticida anticoagulante es posible reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

**Precauciones para animales domésticos:** bajo condiciones normales de uso, siguiendo las instrucciones dadas en esta etiqueta, es poco probable que los animales domésticos en contacto con las áreas tratadas presenten signos de intoxicación los cuales consisten en inapetencia, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel. Recomendaciones al Médico Veterinario.

**Antídoto:** administrar vitamina K1 a la dosis de 5 a 10 mg/ kg SC u oral durante 3 semanas. En casos graves se recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de compatibilidad sanguínea.

**Contraindicaciones:** el contacto con cebaderos de metal puede cambiar la aceptación del producto. No se mezcle con otros plaguicidas. El contacto con insecticidas puede modificar el grado de aceptación o apatía por parte de los roedores. No se utilicen cebaderos metálicos.



# PRECAUCIÓN



MX57423870C